

## EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

Marieke Van Schoors, Taaïke Debeuf, Liesbet Goubert & Lesley Verhofstadt

# EEN KLINISCHE STUDIE BIJ KINDEREN MET LEUKEMIE: IS ER EEN VERBAND TUSSEN SOCIALE STEUN EN EMOTIES BIJ GEZONDE SIBLINGS?

### INLEIDING

Kinderkanker = ingrijpende levensgebeurtenis

Impact op *alle* gezinsleden (ziek kind, ouders, siblings)

→ Verhoogde kans op distress, PTSS, emotionele en gedragsproblemen

→ MAAR, minder onderzoek bij **siblings**

→ Nood aan onderzoek naar **protectieve factoren** bij **siblings**, zoals bijvoorbeeld sociale steun

### METHODE

**Inclusie criteria:** Broers en zussen (>7 jaar) van kinderen (1-18j) met leukemie / Non-Hodgkin lymfoom

**Exclusie criteria:** niet-Nederlandstalige siblings, de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis bij het zieke kind/sibling, herval

**Steekproef:** 10 meisjes, 11 jongens ( $M = 12,95$  jaar);

**Meetinstrumenten:** Sociale Steunlijst (instrumentele, informatieve en emotionele steun) & Situatie Specifieke Emotionele Reactie Vragenlijst (eenzaamheid, machteloosheid, onzekerheid, positieve gevoelens)

**Recrutering via:** UZ Gent, UZ Leuven, UZ Antwerpen en UZ Brussel

### BEPERKINGEN

**Kleine steekproef:** tijdsintensieve & delicate dataverzameling

**Variabele tijd sinds diagnose:** 2 – 12 maanden post-diagnose

**Cross-sectioneel onderzoek:** nood aan longitudinaal onderzoek

**Sociale wenselijkheid** door vragenlijst-onderzoek


### Contact

MARIEKE.VANSCHOORS@ugent.be

Marieke Van Schoors - Universiteit Gent

<http://deimpactvankinderkanker.weebly.com/>

### THEORETISCH KADER



Dubbel ABCX-model; McCubbin & Patterson, 1983

### RESULTATEN

Meer steun door ouders ( $r = -.44$ ), leeftijdsgenoten ( $r = -.48$ ), familie ( $r = -.51$ ) en andere volwassenen ( $r = -.44$ ) is gerelateerd aan minder **eenzaamheid** bij siblings

Meer steun door ouders ( $r = .64$ ) en het zieke kind ( $r = .49$ ) zijn gerelateerd aan minder **machteloosheid\*** bij siblings

Meer steun door andere volwassenen ( $r = .59$ ) is gerelateerd aan meer **positieve gevoelens** bij siblings

\* Verbanden verdwijnen na controle voor leeftijd\_sibling

### KLINISCHE IMPLICATIES

- Psychosociale zorg moet gericht zijn op het **hele gezin** (ziek kind, ouders én siblings)
- **Zorg op maat:** elk gezin heeft nood aan een eigen aanpak (cfr. The pediatric psychology preventative health model; Kazak, 2006)
- Zorgverleners dienen de **protectieve en risico factoren** van gezinnen met een diagnose kinderkanker standaard in kaart te brengen (bv. via de PAT-screening vragenlijst)